



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- **Anotace : Prezentace seznamuje žáky se základními informacemi o žloutence**
- **Autor : Mgr. Ludmila Jakubcová**
- **Jazyk : Čeština**
- **Očekávaný výstup : Získání základních znalostí o žloutence**
- **Speciální vzdělávací potřeby : -žádné-**
- **Klíčová slova : Žloutenka-léčba**
- **Druh učebního materiálu : Prezentace**
- **Druh interaktivity : Aktivita**
- **Cílová skupina : Žák**
- **Stupeň a typ vzdělávání : ZŠ praktická druhý stupeň**
- **Typická věková skupina : 12 – 16 let**
- **Celková velikost : 839 kB**

*Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF
a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.*



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žloutenka

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

- Žloutenka je způsobena zvýšeným množstvím žlutého barviva, které produkuje žluč v lidském těle.
- Objevuje se hlavně při onemocnění jater
- Proti některým typům žloutenky dnes existuje očkování, které však nepůsobí na všechny její druhy.



Jak se můžu žloutenkou nakazit?

- Toto onemocnění může být způsobeno užíváním drog, hlavně když si závislí drogu do těla vpravují injekcí.
- Nadměrným pitím alkoholu.
- Nemytím rukou při použití WC.

- Žloutenka se dělí do několika skupin:
- **1. Žlouteka typu „A“**
- Tímto typem žloutenky se můžeme nakazit z nedostatečné hygieny nebo z potravin.
- K příznakům žloutenky patří únava, zvýšená teplota, bolesti svalů a zežloutnutí kůže a očního bělma.

Léčba

- Nakažený žloutenkou musí být léčen v nemocnici.
- Musí dodržovat přísnou dietu.
- Musí snížit fyzickou námahu a hodně odpočívat.

- **2. Žloutenka typu „B“**
- Tímto typem žloutenky trpí hlavně lidé závislí na drogách, protože se přenáší krví nebo nechráněným sexuálním stykem.
- Projevuje se nechutí k jídlu, zežloutnutím kůže, únavou, horečkou a ztmavnutím moči.

Léčba

- Klidem na lůžku, dietou a snížením tělesné námahy.
- Tato nemoc však může přejít do horšího stádia, které se léčí velice obtížně.

- **3. Žloutenka typu „C“**
- Jedná se o zánět jater, který se mnohdy nemusí projevit.
- Příznaky této nemoci jsou únava, ztráta chuti k jídlu a svědění kůže.
- Touto nemocí nejvíce trpí uživatelé drog.

Léčba

- Neléčení této nemoci může vést až ke zkolabování nebo rakovině jater.
- Na tento typ žloutenky zatím neexistuje očkování.

Odkazy

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marihuana_florecida.JPG?uselang=cs